

Увага! Загроза поширення саранових!

Управління фітосанітарної безпеки та контролю в рослинництві Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області інформує що у зв'язку з масовим розповсюдженням у деяких південних областях України, зокрема Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях стадних видів саранових (Сарани Єгипетської та Італійської і інших видів) існує імовірність потрапляння даних шкідників на територію Харківської області.

Ці шкідники становлять серйозну небезпеку для врожаю через свою високу плодючість, ненажерливість та здатність долати значні відстані. Дорослі особини сарани можуть мігрувати на десятки й навіть сотні кілометрів на добу, а за сприятливих погодних умов – до 200 км і більше. Це означає, що за лічені дні або тижні саранові можуть досягти нашого регіону та завдати значної шкоди посівам.

У Харківській області на даний момент спостерігається живлення личинок та дорослих окриплених комах нестатних видів лише у місцях їх резервації (неорні землі, балки, толоки) за чисельності нижче економічного порогу шкодочинності. Заселення сільськогосподарських посівів поки не виявлено.

Спекотна та суха погода липня створює ідеальні умови для утворення осередків високої чисельності цих шкідників на пасовищах, луках, неорних землях, у лісосмугах, а також у суміжних посівах соняшнику, кукурудзи, овочевих та інших сільськогосподарських культур.

Сарана віддає перевагу злаковим культурам (кукурудза, просо, сорго, пшениця), але може пошкоджувати й інші рослини.

Усі поширені в Україні саранові мають одне покоління на рік, зимуючи у вигляді яєць у ґрунті.

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області наполегливо рекомендує керівникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечити посилення суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з вирощуванням культур сільськогосподарського призначення та населення наглядом за фітостанітарним станом усіх площ орних та неорних земель, присадибних ділянок щодо можливого розвитку саранових, особливу увагу звернувши увагу на райони які межують з Дніпропетровською областю.

У разі виявлення італійського пруса за чисельності 2 – 5 екз. на кв.м, нестатних саранових – 10 - 15 екз. на кв.м, застосовують хімічні обробки.

Захисні обробки проти саранових розпочинають за масової появи личинок I віку. Основну масу личинок стадних саранових слід ліквідувати за розвитку їх у III-IV віці, до окрилення слід завершити хімічні заходи.

Методи обробки хімічними препаратами (суцільні, крайові, локальні – у місцях високої концентрації шкідника) залежать від конкретних умов та кількості шкідників. Використовуйте інсектициди згідно з «Переліком пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

Обов'язково дотримуйтесь заходів безпеки: За 3 доби до проведення хіміобробки необхідно попередити населення про заходи безпеки.



Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
№3.3-057/2/11051-25 від 24.07.2025
КЕП: БАКУМОВ Д. С. 24.07.2025 21:16
5E984D526F82F38F04000000138D44015A3C6206
Сертифікат дійсний з 13.06.2025 11:32 до 13.06.2026 23:59

селищних рад, а також власників пасік про час та місце проведення робіт, вказавши назву, ступінь і строк дії токсичності препарату. Всі хімічні обробки проводьте з дотриманням регламентів застосування засобів захисту рослин, техніки безпеки та санітарних правил при роботі з ними.

Про будь-які ознаки масового скупчення стадних видів саранових обов'язково повідомляйте Управління фітосанітарної безпеки та контролю в рослинництві Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

